

Information Gallenblasenentfernung

Lieber Patient, liebe Patientin

Gallenblase

Die Gallenblase liegt anliegend an die Leberunterseite auf der rechten Seite des Körpers im Oberbauch. Ihre Funktion ist die Speicherung der Galle, die Sie im Moment nicht brauchen. Die Galle ist für die Fettverdauung mitverantwortlich. Die Galle selber wird in der Leber gebildet.

Funktionsstörung der Gallenblase

Die Galle kann aufgrund der veränderten Zusammensetzung der einzelnen Komponenten Steine bilden. Dies ist eine Zivilisationskrankheit in unseren Breitengraden. Frauen sind häufiger betroffen. Diese Steine können ohne Symptome sein, die Gallenblase kann jedoch durch die Steine gereizt werden und sich akut oder chronisch entzünden. Bei akuten Entzündungen ist die Gallenblase sobald als möglich zu entfernen. Bei chronischen Entzündungen kann ein Eingriff geplant werden. Die erwähnten Steine können jedoch auch über den Gallengang abgehen und diesen verstopfen. Da dies anatomisch im Bereich des Bauchspeicheldrüsenkopfes vorkommt, kann als Komplikation eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse vorkommen und/oder eine Gelbverfärbung der Haut auftreten.

Entfernung der Gallenblase


Eine Gallenblase, die Schmerzen verursacht, muss entfernt werden. Dies ist die einzige Heilungsmöglichkeit.

Die Entfernung der Gallenblase geschieht heute fast immer minimalinvasiv, d.h. mit kleinen Schnitten und mit Hilfe einer Kamera. Dies ist nur bei Verwachsungen aufgrund von Voroperationen oder massiven Entzündungen nicht möglich.

Die häufigste Operationsmethode ist die Entfernung der Gallenblase über 3 – 4 kleine Schnitte (6 – 15 mm) (Siehe Skizze unten)

Bei Frauen kann die Gallenblase auch über die Scheide entfernt werden. Dies hat m.E. vor allem bei Patientinnen mit sehr grossen Steinen (≥ 3 cm) Vorteile.

Die Entfernung über einen einzigen dafür aber grösseren Schnitt (>2.5 cm) am Bauchnabel ist ebenfalls möglich



Risiken einer Gallenblasenentfernung

Die Entfernung der Gallenblase ist in erfahrenen Händen sehr risikoarm. Vorkommen können:

Ab und zu : < 10 %

- Hautinfektionen im Bereich der Wunden,
- Kleine Blutergüsse

Selten : < 0.5 %

- Infektionen im Bauch
- Steine im Gallengang

Äusserst Selten : < 0.01 %

- Verletzungen anderer Organe
- Fälschlicherweise Durchtrennung vom Hauptgallengang anstatt Gallenblasengang (bei unklaren Situationen)

Einwilligung:

Ich bestätige, dass ich über obengenannte Operation informiert und mit dem Eingriff einverstanden bin.

Name Patient

Unterschrift Patient

Datum

Unterschrift Arzt

Datum

Bitte zurücksenden an :

Dr. med. Michel Kocher